

### 移植藥物信息

患者姓名/病例號: \_\_\_\_\_

主要聯繫電話: (617) 632-9700

移植協調員: \_\_\_\_\_

電話: \_\_\_\_\_

藥房電話: \_\_\_\_\_

VNA 電話: \_\_\_\_\_

病人和醫護人員在接觸藥物前後請徹底洗淨雙手

藥物	樣品	用途	說明	注意事項
<b>Tacrolimus</b> 他克莫司( Prograf)	 0.5 毫克  1 毫克  5 毫克 圖為 Sandoz 藥廠的非品牌藥	防止排異反應; 抑制免疫系統	請勿在抽血化驗當 天早上服用, 請在 <u>抽血後服用</u>  每 12 小時服用一次  或空腹或飯後請堅持用 藥的一致性	*** 終生藥物***  <u>常見不良反應</u> - 頭痛 - 發抖 - 手足發麻 - 脫髮 - 高鉀
<b>Mycophenolate Mofetil</b> 嗎替麥考酚 酯 (Cellcept) 或 <b>Mycophenolic Acid DR</b> 麥考酚酸 (Myfortic)	 500 毫克 圖為 Roxane 藥廠的非品牌藥 或 360 毫克  圖為 Mylan 藥廠的非品牌藥	防止排異反應; 抑制免疫系統	或空腹或飯後請堅持用 藥的一致性  通常每 12 小時服用一次	*** 終生藥物*** (用於腎臟和 / 或胰腺移植病人)  <u>常見不良反應</u> - 惡心 - 嘔吐 - 腹瀉 - 反酸燒心  若每日排稀鬆大便超過 4-6 次, 請通知移植協調員
<b>Prednisone</b> 強的松	 5 毫克 非品牌藥外觀或有 不同	防止排異反應; 抑制免疫系統	與食物同時服用  每日晨起服用一次  如有提供減量停藥說 明, 請參照	<u>常見不良反應</u> - 食慾亢進 - 血糖升高 - 情緒變動

藥物	樣品	用途	說明	注意事項
<b>Valganciclovir</b> 纈更昔洛韋 <b>(Valcyte)</b>	 450 毫克 圖為名為Valcyte的品 牌藥	防止病毒感染	所用劑量參考腎功能	- 服用 3 至 6 個月 停藥日期:_____
<b>Sulfamethoxazole/ Trimethoprim</b> 磺胺甲噁唑 / 甲氧苄啶 <b>(Bactrim SS or SMZ/TMP)</b>	 1 片 非品牌藥外觀或有 不同	防止肺部和泌尿系 統感染	每日一次	- 大部份病人服藥一年
<b>Nystatin Solution</b> 制霉菌素 溶液 或 <b>Fluconazole</b> 氟康唑 <b>(Diflucan)</b>	 5 毫升 或  200 毫克 非品牌藥外觀或有 不同	防止口腔和咽喉部 真菌感染	服用制霉菌素 溶液後禁食禁水 20 分鐘 制霉菌素 溶液每日服用 4 次 氟康唑每日服用 1 次	- 制霉菌素 - 腎臟和 / 或胰腺移植病人 - 4 周 - 氟康唑 - 肝移植 - 2 個月 - 與他克莫司相互作用, 忘服本藥將會導致他克莫司 水平降低和 排異反應 - 停服本藥時他克莫司的劑量 需要相應調整, 相關說明將 會提供
<b>Famotidine</b> 法莫替丁 <b>(Pepcid)</b> 或Ranitidi ne 雷尼替丁 <b>(Zantac)</b> ( 善胃得 )	 20 毫克或  150 毫克 非品牌藥外觀或有 不同	預防胃潰瘍	每日服用 1 至 2 次	- 器官移植後服用 8 周如果病人沒有服用 Protonix 或 Prilosec (見下文)
<b>Pantoprazole</b> 泮托拉唑 <b>(Protonix)</b> 或 <b>Omeprazole</b> 奧美拉唑 <b>(Prilosec)</b>	 40 毫克  20 毫克 非品牌藥外觀或有 不同	預防胃潰瘍	每日服用 1 次或 2 次	- 器官移植前若病人服用此藥 ( 或同 類藥物 ) 請繼續服用

<p><b>Sodium polystyrene sulfate</b> 聚苯乙烯磺酸钠 (Kayexalate)</p>		<p>降低血鉀</p>	<p>務必在醫生指導下用藥</p>	<p>- 可能導致腹瀉</p>
<p><b>Oxycodone</b> 歐克西克錠 或 <b>Hydromorphone</b> 氢吗啡酮 (Dilaudid)</p>		<p>止痛藥</p>		<p>- 只在疼痛時服用</p>
<p><b>Docosate sodium</b> 多库酯钠 (DOC-Q-LACE) 和 / 或 <b>Senna (Senokot)</b></p>		<p>大便軟化劑</p>	<p>腹瀉時請勿服用</p>	<p>- 如不服用上述止痛藥，本藥可不服用</p>