

Colonoscopia: Instruções do Clenpiq em Duas Doses

IMPORTANTE: Leia estas instruções agora para estar preparado para o procedimento. Se tiver alguma pergunta ou precisar cancelar ou remarcar a sua consulta, por favor ligue para o 617-754-8888.

Onde se deve apresentar para o procedimento:

East Campus, 330 Brookline Ave, Boston

○ Stoneman 3º andar

○ Stoneman 4º andar

Estacione na garagem Feldberg

West Campus, 185 Pilgrim Road, Boston

West Procedural Center (WPC), Farr 1º andar

Estacione na garagem da Pilgrim Road ou do Lowry Building

Beth Israel Deaconess, Lexington Campus

482 Bedford Street, Lexington, Ambulatory Surgery, 1º andar

Dia/Data: _____

Hora de chegada: _____

Hora do procedimento: _____

Hora aproximada de alta: _____

Médico que vai fazer o exame:

Preparação para o procedimento

- ❖ **Medicamentos** – Se toma Pepto-Bismol ou qualquer suplemento que contenha ferro, pare de tomá-lo 7 dias antes do procedimento. Pode continuar a tomar aspirina ou outros medicamentos para a dor. Se toma **medicamentos anticoagulantes (para “afinar” o sangue)**, por favor ligue-nos se não tiver discutido isso no momento que agendou a consulta. **NÃO faça nenhuma mudança** nesses medicamentos sem orientação médica.
- ❖ **Diabete** - contacte o médico que acompanha o seu diabete antes de fazer quaisquer mudanças na sua alimentação, medicamentos ou bomba de insulina.
- ❖ **Se estiver grávida** - converse com o seu obstetra antes da consulta para determinar o melhor momento de fazer o procedimento e o melhor regime de anestesia ou sedação.
- ❖ **Sedação** - a maioria dos pacientes recebe sedativos ao fazer procedimentos. Avise-nos com antecedência se tiver alguma das seguintes situações que possam condicionar o tipo de sedação a receber:
 - Reação alérgica ou outros problemas relacionados com sedativos ou medicamentos para a dor e narcóticos
 - Se pesa mais de 300 libras
 - Se toma narcóticos para a dor
 - Se tem doença grave do fígado
- ❖ Enquanto se recupera da sedação, não volte ao trabalho ou escola, não tome decisões importantes nem cuide de crianças. Poderá voltar às atividades normais no dia seguinte, a não ser que tenha sido instruído de forma diferente.
- ❖ **DEVE TER ALGUÉM PARA LEVÁ-LO PARA CASA** - um adulto responsável deve ir ao andar de procedimentos quando você estiver pronto para receber a alta. Não há nenhuma exceção para esta regra, a não ser que planeie não receber sedação durante o procedimento. Se quiser fazer isso, deve conversar com o médico antes. **Não poderá dirigir de volta para casa após ter estado sedado.**
- ❖ Para mais informações, visite a página **Preparação para o procedimento** (*Preparing for your Procedure*) no nosso website. Basta escanear esse código com a câmara do seu celular ou vá a www.bidmc.org/gipreps



Preparação intestinal para colonoscopia: Clenpiq duplo

Preparação — Lista de verificação

Sete (7) dias antes da colonoscopia

- Inicie uma dieta pobre em resíduos. Consulte na ficha informativa incluída as indicações sobre os alimentos que deverá evitar.

Dois (2) dias antes da colonoscopia

- Inicie uma dieta de líquidos claros logo ao acordar. Certifique-se de que bebe bastantes líquidos claros ao longo dos dois dias seguintes. Consulte na ficha informativa uma lista de líquidos claros.
- 15h00 – Clenpiq, dia 1, dose 1:** beba um frasco de solução de preparação Clenpiq (5.4 oz.)
Nas duas horas seguintes: beba, pelo menos, cinco copos de 8 onças de líquidos claros.
- 21h00 – Clenpiq, dia 1, dose 2:** beba um segundo frasco de solução de preparação Clenpiq (5.4 oz.)
Nas duas horas seguintes: beba, pelo menos, cinco copos de 8 onças de líquidos claros.

No dia anterior à colonoscopia

- Mantenha a dieta de líquidos claros. Certifique-se de que bebe bastantes líquidos claros ao longo do dia.
- 19h00 – Clenpiq, dia 2, dose 1:** beba outro frasco de 5.4 oz. de Clenpiq.
Nas duas horas seguintes: beba, pelo menos, cinco copos de 8 onças de líquidos claros. Tem de completar esta dose antes de se deitar.

IMPORTANTE!

Deve ler todas as instruções pelo menos uma semana antes da sua intervenção e ligar para os nossos serviços se tiver qualquer dúvida.



Vai precisar de:

- Clenpiq Rx a adquirir na farmácia — quatro (4) frascos**
- Opcional:
 - Três (3) garrafas (16 oz. cada) de líquidos claros ou bebidas energéticas (exceto vermelho ou rosa)
 - Embalagens de gelatina (Jell-O), qualquer cor exceto vermelho ou rosa
 - Cubos de caldo de legumes, galinha ou carne
 - Toalhetas de bebé

Sugestões para a preparação

- Se sentir náuseas durante a preparação, experimente chupar limão ou tomar um chá de hortelã-pimenta.
- Tomar a solução de preparação bem fresca também poderá ajudar.
- Quando começar a ter diarreia, pode usar as toalhetas de bebé para evitar irritação. Evite usar vaselina ou Desitin.

Preparação intestinal para colonoscopia: Clenpiq duplo

Preparação — Lista de verificação (continuação)

No dia da colonoscopia

6 horas antes da hora marcada para a intervenção –

Clenpiq, dia 2, dose 2: beba o último frasco de 5.4 oz. de Clenpiq.

Nas duas horas seguintes: beba, pelo menos, cinco copos de 8 onças de líquidos claros.

Compreendemos que poderá ter de acordar a meio da noite para tomar a última dose, no entanto, sabemos que este é o método que resulta num cólon mais limpo. Embora as suas fezes possam tornar-se claras antes de terminar a preparação, é importante que tome todas as doses.

4 horas antes da hora marcada para a intervenção:

Pare de beber todos os líquidos. Se tiver de tomar medicação de manhã, pode fazê-lo com um pequeno gole de água. Se sofrer de diabetes ou tomar anticoagulantes, siga as indicações do seu médico relativamente a alterações que possam ser necessárias na sua medicação.

IMPORTANTE!

Deve ler todas as instruções pelo menos uma semana antes da sua intervenção e ligar para os nossos serviços se tiver qualquer dúvida.



Dieta de líquidos claros e de baixos resíduos

Segue-se um guia de alimentos que pode comer durante a dieta de baixos resíduos antes do procedimento, assim como uma lista de líquidos claros para essa etapa da preparação. De uma forma geral, evite qualquer alimento duro ou fibroso e qualquer coisa que contenha grãos integrais, frutos secos, sementes, casca ou corante vermelho.

IMPORTANTE!

Uma dieta de baixos resíduos ajudará a ter o melhor resultado na preparação do intestino. Se não tiver a certeza se um alimento é de baixos resíduos, é melhor não comer enquanto se preparar para o procedimento.



| Grupo alimentar | Alimentos permitidos | Alimentos a evitar |
|-------------------------------------|--|---|
| Leite e laticínios | Leite, leite de soja ou frutos secos (desde que não tenham sedimentos), gelados, iogurte, queijo | Produtos que não são à base de leite com pedaços de frutos secos, sementes ou frutas adicionadas |
| Bebidas | Café, chá, refrigerante, sumos sem polpa, refresco Kool-Aid (sem corante vermelho), Boost, Ensure ou outros suplementos nutricionais sem fibra adicionada | Nenhum sumo com polpa, sementes, fibra adicionada nem sumo de ameixa |
| Pães, cereais e amido | Quaisquer pães refinados, tais como English muffins, pão pita, pãozinho tipo biscuit, muffins, bolachas e biscoitos, panquecas americanas, waffles, cereais como Cheerios, Cornflakes, Rice Krispies, arroz branco, massas refinadas | Nenhum grão integral, aveia, granola, qualquer coisa com sementes ou frutos secos, pão de milho, bolachas tipo graham cracker, arroz preto ou integral, casca de batata, quinoa |
| Frutas | Fruta enlatada ou cozida sem casca ou semente, puré de maçã, banana bem madura, molho de mirtilo (<i>cranberry</i>) em forma de gelatina | Nenhuma fruta crua (exceto bananas bem maduras), abacaxi enlatado, laranja, salada de frutas, frutos secos, molho de mirtilo, abacate |
| Verduras | Verduras macias, bem cozidas, enlatadas ou congeladas, sem semente ou casca como cenoura ou beterraba sem casca, sumo de verduras ou molho de tomate coados | Nenhuma verdura crua ou cozida que seja dura ou fibrosa, tal como brócolos, espargos, espinafres etc. |
| Carne e substitutos de carne | Peixe, galinha, vaca e porco macios e cozidos, ovos, tofu, pasta de frutos secos cremosa | Nenhuma parte dura da carne (cartilagem), carnes frias ou linguiça, nenhum substituto de carne feito de grãos integrais, sementes ou pedaços de frutos secos, feijão, ervilhas ou lentilhas |
| Vários | Sal, açúcar, temperos moídos ou em flocos, chocolate, qualquer condimento líquido ou pastoso como ketchup, molho de soja, maionese ou geleia (mas não marmelada ou fruta em conserva) | Nenhum tipo de pimenta, tempero em semente ou outras sementes, frutos secos, pipocas, pickles, azeitonas |

Dieta de líquidos claros: Mantenha-se hidratado e tome muitos líquidos claros durante o dia!

Ao chegar à etapa de líquidos claros da preparação, pode tomar apenas: água, refrigerante de cor clara, chá ou café (preto, sem natas nem leite), sumos claros, Gatorade ou outras bebidas desportivas (sem corante vermelho), caldo (líquido ou cubinho) de galinha, vaca ou verdura, gelatina (que não seja vermelha) e gelado de água (que não seja vermelho).

Nada de alimentos sólidos. Nada de balas (rebuçados) ou gomas, chicletes, bebidas com corante vermelho, produtos lácteos, sumo com polpa e álcool.