
**С ИНСТИТУТОМ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ СЛЕДУЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ В РАБОЧИЕ ЧАСЫ В
СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЯХ:**

- Повторное получение рецептов на лекарства, включая **болеутоляющие средства. Повторное получение по рецепту наркотических средств допускается только в часы работы медицинского офиса.**
- Запрос на предварительное утверждение лечения со стороны страховой компании
- Запрос на подтверждение или перенос запланированных визитов к врачу
- Запрос на получение результатов анализов
- Запрос на получение индивидуальных данных МКСЗП (MELD)
- Запрос на направление результатов анализов лечащему врачу
- Вопросы о типировании тканей
- Запрос на информацию о плановых прививках
- Запрос на получение нового направления на анализы

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- При необходимости связаться с дежурным координатором по пейджеру, пожалуйста, будьте готовы своевременно ответить на телефонный звонок
- За пациентами BIDMC и отделения неотложной помощи наблюдают врачи стационара
- Помните, что по вечерам, праздникам и выходным дням прием и отправка факсов не производятся

НЕОТЛОЖНАЯ И ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

**С ИНСТИТУТОМ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ СЛЕДУЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

Звоните по тел. 617-632-9700 при наличии одного или более из названных ниже симптомов. Сотрудники телефонной службы вызовут дежурного врача-координатора, ответственного за помощь пациентам, которым была сделана операция по пересадке печени.

- Температура выше 101 градуса по Фаренгейту (38,3 по Цельсию)
- Сильные спазмы в области желудка, рвота или понос, невозможность принимать лекарства, выписанные после получения донорского органа
- Запор и боль в животе
- Усиление боли, покраснение или вздутие в месте операционного разреза
- Кровянистые или гнойные выделения из операционного разреза
- Боль или жжение при мочеиспускании, учащение или неотложные позывы на мочеиспускание
- Прибавка в весе на три фунта или более за три дня
- Гриппозные симптомы, такие как озноб, ломота в суставах или головная боль
- Повышение уровня глюкозы в крови до более чем 400 ккал
- Болезненная чувствительность в области печени
- Темная или чайного цвета моча
- Светлый или глинистого цвета стул
- Пожелтение кожи или глазных белков