



Beth Israel Deaconess
Medical Center



HARVARD MEDICAL SCHOOL
TEACHING HOSPITAL

Информация о Трансплантационных препаратах

Имя пациента/номер истории болезни: _____ Основной номер: (617) 632-9700

Координатор трансплантации: _____ № телефона: _____

№ телефона аптеки: _____ № телефона патронажной медсестры: _____

Пациенты и обживающие их лица должны тщательно мыть руки до и после контакта с препаратами.

Препараты	Образец	Действие	Инструкции	Дополнительная информация
Такролимус (Програф) Tacrolimus (Prograf)	 0.5 мг  1 мг  5 мг изображения генерической версии “Сандоз”	Предотвращает отторжение; подавляет иммунную систему	Не принимайте утром в день забора крови, <u>пока не</u> <u>взяты анализы крови</u>. Принимается каждые 12 часов Принимайте регулярно в одно и то же время Будьте последовательны в приеме препарата -принимайте либо всегда с едой, либо всегда натощак	*** Пожизненный препарат *** <u>Распространенные побочные эффекты</u> - Головная боль - Озноб - Покалывание в ладонях и ступнях - Выпадение волос - Повышение уровня калия в крови
Микофенолат-мофетил (Селлсепт) или Микофеноловая кислота пролонгированного действия (Мифортик) Mycophenolate Mofetil (Cellcept) OR Mycophenolic Acid DR (Myfortic)	 500 мг изображение генерической версии производства лабораторий “Роксан” или  360 мг изображение генерической версии “Майлан”	Предотвращает отторжение; подавляет иммунную систему	Принимается каждые 12 часов Принимайте регулярно в одно и то же время Будьте последовательны в приеме препарата -принимайте либо всегда с едой, либо всегда натощак	*** Пожизненный препарат *** (Для пациентов с пересадкой почек и/или поджелудочной железы) <u>Распространенные побочные эффекты</u> - Тошнота - Рвота - Понос - Изжога Известите координатора трансплантации если у Вас наблюдается жидкий стул чаще 4-6 раз в день
Преднизон Prednisone	 5 мг (генерическая версия может выглядеть иначе)	Предотвращает отторжение; подавляет иммунную систему	Принимайте с едой Принимается раз в день, по утрам Следуйте схеме уменьшения дозы	<u>Распространенные побочные эффекты</u> - Повышение аппетита - Повышение уровня сахара крови - Резкие смены настроения

Препараты	Образец	Действие	Инструкции	Дополнительная информация
Валганцикловир (Валцит) Valganciclovir (Valcyte)	 450 мг Изображение оригинальной версии препарата "Валцит"	Предотвращает вирусные инфекции	Дозировка меняется в зависимости от показателей функции почек	- Принимается в течение 3-6 месяцев Дата прекращения: _____
Сульфаметоксазол/ Триметоприм (Бактрим СС или СМЗ/ТМП) Sulfamethoxazole/ Trimethoprim (Bactrim SS or SMZ/TMP)	 1 таблетка (генерическая версия может выглядеть иначе)	Предотвращает инфекции в легких и мочевом пузыре	Принимается раз в день	- Большинство пациентов принимается в течение одного года
Раствор Нистатина или Флуконазол (Дифлюкан) Nystatin solution or Fluconazole (Diflucan)	 5 мл или  200 мг (генерическая версия может выглядеть иначе)	Предотвращает грибковые инфекции рта и гортани	Не ешьте и не пейте в течение 20 минут после приема Нистатина Нистатин принимается 4 раза в день Флуконазол принимается один раз в день	- Нистатин – для пациентов с пересадкой почек и/или поджелудочной железы - в течение 4 недель - Флуконазол – для пациентов с пересадкой печени - в течение 2 месяцев - Взаимодействует с Такролимусом : пропуск дозы ведет к понижению уровня Такролимуса и отторжению - При прекращении приема препарата будет предоставлена инструкция по изменению дозы Такролимуса
Фамотидин (Пепсид) или Ранитидин (Зантак) Famotidine (Pepcid) or Ranitidine (Zantac)	 20 мг или  150 мг (генерическая версия может выглядеть иначе)	Предотвращает появление язвы желудка	Принимается один или два раза в день	- Принимается в течение 8 недель после трансплантации пациентами, не принимающими Протоникс или Прилосек (смотри ниже)
Пантопразол (Протоникс) Или Омепразол (Прилосек) Pantoprazole (Protonix) or Omeprazole (Prilosec)	 40 мг или  20 мг (генерическая версия может выглядеть иначе)	Предотвращает появление язвы желудка	Принимается один или два раза в день	- Пациент будет продолжать прием данного (или сходного с ним) препарата, если эти лекарства применялись до трансплантации
Полистирол- сульфат натрия (Кайексалат) Sodium polystyrene sulfate (Kayexalate)		Уменьшает содержание калия в крови	Принимайте только по предписанию Вашего координатора	- Может вызывать понос
Оксикодон или Гидроморфон (Дилаудид) Oxycodone Or Hydromorphone (Dilaudid)		Обезболивающее средство		- Принимать только при необходимости, для снятия болей
Докузат натрия (DOC-Q-lace) и/или Сенна (Сенокот) Docusate sodium (DOC-Q-LACE) and/or Senna (Senokot)		Предотвращает запоры	Не принимайте при поносе	- Может не понадобиться, если не принимаются вышеуказанные обезболивающие