

Información sobre medicamentos para pacientes con un trasplante







Nombre del paciente/Nº. de historia clínica: _____









Tel. principal: (617) 632-9700

Coordinador de trasplantes: _____ Tel.: _____

Tel. de la farmacia: _____ Tel. de la VNA: _____

Los pacientes y los cuidadores deben lavarse perfectamente las manos antes y después de manipular los medicamentos

Medicamentos	Muestra	Acción	Instrucciones	Otra información importante
Tacrolimus (Prograf)	 0,5 mg  1 mg  5 mg Imágenes de medicamentos genéricos de Sandoz	Previene el rechazo; inhibe el sistema inmunitario	<p>No lo tome en la mañana en que le vayan a extraer sangre, tómelo <u>después de la extracción de sangre.</u></p> <p>Tomar cada 12 horas</p> <p>Tomar siempre de la misma manera, con o sin comida.</p>	<p>***Medicamento para siempre***</p> <p><u>Efectos secundarios frecuentes</u></p> <p>Dolor de cabeza</p> <p>Temblores</p> <p>Hormigueo en las manos y los pies</p> <p>Caída del cabello</p> <p>Aumento del potasio</p>
Micofenolato de mofetilo (Mycophenolate mofetil) (Cellcept) o Ácido micofenólico (liberación prolongada) (Myfortic)	 500 mg Imagen del medicamento genérico de Roxane o  360 mg Imagen del medicamento genérico de Mylan	Previene el rechazo; inhibe el sistema inmunitario	<p>Tomar siempre de la misma manera, con o sin comida.</p> <p>Tomar cada 12 horas</p>	<p>***Medicamento para siempre***</p> <p>(Para pacientes con insuficiencia renal y/o trasplante de páncreas)</p> <p><u>Efectos secundarios frecuentes</u></p> <p>Náuseas</p> <p>Vómitos</p> <p>Diarrea</p> <p>Ardor estomacal</p> <p>Si tiene más de 4 a 6 deposiciones flojas al día, infórmelo a su coordinador de trasplantes.</p>
Prednisona (Prednisone)	 5 mg La versión genérica puede verse diferente	Previene el rechazo; inhibe el sistema inmunitario	<p>Tomar con comida</p> <p>Tomar una vez al día, por la mañana</p> <p>Se debe dejar de tomar gradualmente</p>	<p><u>Efectos secundarios frecuentes</u></p> <p>Aumento del apetito</p> <p>Aumento del nivel de azúcar en la sangre</p> <p>Cambios del humor</p>

Medicamentos	Muestra	Acción	Instrucciones	Otra información importante
Valganciclovir (Valcyte)	 450 mg Imagen de la marca Valcyte	Previene infecciones virales	La dosis varía según el funcionamiento renal	- Se debe tomar durante 3 a 6 meses Fecha de finalización: _____
Trimetoprima / Sulfametoxazol (Sulfamethoxazole/Trimethoprim) (Bactrim SS o SMZ/TMP)	 1 tableta La versión genérica puede verse diferente	Previene infecciones de pulmón y de orina	Tomar una vez al día	- La mayoría de los pacientes deben tomarlo durante un año
Nistatina (Nystatin) en solución o Fluconazol (Diflucan)	 5 ml o  200 mg La versión genérica puede verse diferente	Previene infecciones por hongos en la boca y la garganta	No comer ni beber nada durante 20 minutos después de la dosis de nistatina La nistatina se usa 4 veces al día El fluconazol se toma una vez al día	- Nistatina: 4 semanas en pacientes con insuficiencia renal y/o trasplante de páncreas - Fluconazol: 2 meses para trasplante de hígado - Interactúa con el tacrolimus, las dosis olvidadas aumentan los niveles de tacrolimus y el rechazo - Cuando lo suspenda, le darán instrucciones sobre el cambio necesario de la dosis de tacrolimus
Famotidina (Pepcid) o Ranitidina (Ranitidine) (Zantac)	 20 mg o  150 mg La versión genérica puede verse diferente	Previene úlceras de estómago	Tomar 1 o 2 veces al día	- Los pacientes que no toman Protonix o Prilosec (véase a continuación) deben tomarlo durante 8 semanas después del trasplante
Pantoprazol (Protonix) u Omeprazol (Omeprazole) (Prilosec)	 40 mg o  20 mg La versión genérica puede verse diferente	Previene úlceras de estómago	Tomar 1 o 2 veces al día	- Debe continuar tomando este medicamento (o con un medicamento similar) si lo tomaba antes del trasplante
Sulfato sódico de poliestireno (Kayexalate)		Reduce el nivel de potasio	Tomar solamente cuando lo indique su coordinador	- Puede causar diarrea
Oxicodona o Hidromorfona (Dilaudid)		Analgésico		- Tómelo sólo si es necesario para aliviar el dolor
Docusato sódico (DOC-Q-LACE) y/o Senna (Senokot)		Ablandador de las heces	No lo tome si tiene diarrea	- Si no toma los analgésicos mencionados anteriormente, tal vez no lo necesite