


Thông tin thuốc cấy ghép

Tên bệnh nhân/MRN: _____ Số điện thoại: (617) 632-9700

Điều phối viên cấy ghép: _____ Số điện thoại: _____

Số điện thoại tiệm thuốc tây: _____ Số điện thoại VNA: _____

Bệnh nhân và người chăm sóc nên rửa tay cẩn thận trước và sau khi quản lý thuốc

Tên thuốc	Mẫu	Tác dụng	Hướng dẫn	Các thông tin quan trọng khác
Tacrolimus (Prograf)	 0,5mg  1mg  5mg Hình ảnh của Sandoz generic	Chống lại sự thải ghép, ức chế hệ thống miễn dịch	Không được uống vào buổi sáng khi bạn đi thử máu, cho đến <u>sau khi thử máu xong</u> . 12 tiếng đồng hồ uống một lần Nên uống đều đặn cùng với thức ăn hoặc không.	*** Thuốc vĩnh viễn*** <u>Tác dụng phụ thường gặp</u> - Đau đầu - Run rẩy - Ngứa ngứa ở tay và chân - Rụng tóc - Lượng kali cao
Mycophenolate Mofetil (Cellcept) hoặc Mycophenolic Acid DR (Myfortic)	 500mg Hình ảnh của Roxane generic hoặc  360mg hình ảnh của Mylan generic	Chống lại sự thải ghép, ức chế hệ thống miễn dịch	Nên uống đều đặn cùng với thức ăn hoặc không 12 tiếng đồng hồ uống một lần	*** Thuốc vĩnh viễn*** (Đối với bệnh nhân cấy ghép thận và/hoặc tuyến tụy) <u>Tác dụng phụ thường gặp</u> - Buồn nôn - Ói mửa - Tiêu chảy - Tim đập nhanh Thông báo cho điều phối viên cấy ghép nếu bạn đi phân lỏng hơn 4-6 lần/ngày
Prednisone	 5mg Loại thông thường có vẻ khác	Chống lại sự thải ghép, ức chế hệ thống miễn dịch	Uống cùng với thức ăn Nên uống một lần một ngày vào buổi sáng Nên theo hướng dẫn nếu được cung cấp	<u>Tác dụng phụ thường gặp</u> - Ăn ngon miệng hơn - Lượng đường trong máu tăng - Tính tình thay đổi

Tên thuốc	Mẫu	Tác dụng	Hướng dẫn	Các thông tin quan trọng khác
Valganciclovir (Valcyte)	 450 mg Hình ảnh của hiệu Valcyte	Ngăn ngừa nhiễm vi rút	Liều dùng khác nhau tùy theo chức năng thận	- Sẽ được dùng từ 3-6 tháng Ngưng ngày: _____
Sulfamethoxazole/ Trimethoprim (Bactrim SS or SMZ/TMP)	 1 viên Loại thông thường có vẻ khác	Ngăn ngừa viêm phổi và tiết niệu	Uống một lần mỗi ngày	- Sẽ được dùng trong vòng một năm đối với hầu hết các bệnh nhân
Nystatin dung dịch hoặc Fluconazole (Diflucan)	 5mL hoặc  200mg loại thông thường trong có vẻ khác	Ngăn ngừa nhiễm nấm trong miệng và cổ họng	Không được ăn hoặc uống trong vòng 20 phút sau khi dùng liều Nystatin Nystatin được uống 4 lần mỗi ngày Fluconazole được uống 1 lần mỗi ngày	- Nystatin - Đối với bệnh nhân cấy ghép thận và/hoặc tuyến tụy - 4 tuần - Fluconazole - Cấy ghép gan - 2 tháng - Tương tác với tacrolimus, nếu không dùng thuốc đều đặn sẽ dẫn đến lượng tacrolimus thấp và hiện tượng thải ghép - Hướng dẫn về việc thay đổi liều tacrolimus sẽ được cung cấp nếu ngưng thuốc
Famotidine (Pepcid) hoặc Ranitidine (Zantac)	 20 mg hoặc  150 mg Loại thông thường có vẻ khác	Ngăn ngừa loét dạ dày	Nên uống một lần hoặc hai lần mỗi ngày	- Sẽ được uống trong vòng 8 tuần sau khi cấy ghép trong trường hợp bệnh nhân không dùng Protonix hoặc Prilosec (xem thêm bên dưới)
Pantoprazole (Protonix) hoặc Omeprazole (Prilosec)	 40 mg  20 mg Loại thông thường có vẻ khác	Ngăn ngừa loét dạ dày	Nên uống một lần hoặc hai lần mỗi ngày	- Sẽ được tiếp tục dùng thuốc này (hoặc thuốc tương tự) trước khi được cấy ghép
Sodium polystyrene sulfate (Kayexalate)		Giảm lượng Kali trong máu	Chỉ nên uống khi được điều phối viên hướng dẫn	- Có thể gây ra tiêu chảy
Oxycodone hoặc Hydromorphone (Dilaudid)		Thuốc giảm đau		- Chỉ nên dùng khi cần thiết
Docusate sodium (DOC-Q-LACE) và/hoặc Senna (Senokot)		Làm mềm phân	Không nên uống nếu có tiêu chảy	- Không cần thiết nếu không dùng thuốc giảm đau bên trên