術前準備

這些重要資訊有關您的手術,請仔細閱讀。如有任何疑問,請

Preparing for your surgery, Traditional Chinese

聯繫外科醫生。外科醫生可能會給您提供其他說明,例如腸道 準備或其他準備,具體取決於您要進行的手術類型。在某些情況下,外科醫生的說明 中可能包含本文件未包含的資訊,例如額外淋浴或飲用某些液體。**請務必遵循外科醫** 生或術前檢查護士提供的其他任何說明。如有疑問,請聯繫外科醫生。

Date/time of surgery (手術日期/時間): (待手術前一天確認)

到達時間:您的**到達時間**大約在計畫開始手術之**前一個半小時**。將在手術前一天由外 科醫生辦公室確認您的到達時間。請務必按時到達醫院,以便我們為您進行術前準備。

請在手術前一天下午 2:30 至 4:30 之間打電話給外科醫生辦公室,確認您的到達時間

和登記地點。如果手術在星期一進行,請在星期五打電話。

手術前數天/週

- 您將通透過電話或當面與術前檢查(PAT)診所的 護士交談。確保告訴護士您正在使用或可能使用的 所有藥物。包括處方藥、非處方藥、維生素、草藥 和補充劑。
- 護士和/或外科醫生可能會為您提供有關變更藥物的 特別說明。請不要自行變更任何藥物。尋求建議。 護士也會告訴您在手術當天使用哪種藥物。
- 糖尿病藥物和血液稀釋劑:
 - o Insulin (胰島素)或其他糖尿病藥物:確保您知 道在手術前一天晚上和/或當天如何使用這些藥 物。確保您瞭解如果在這段時間內發生低血糖該 怎麼辦。您可以從外科醫生或術前檢查護士那裡 獲得指導。如果您不知道在這段時間內應如何使 用這些藥物或如何治療低血糖,請聯繫外科醫生。

您的藥物:請務必與術前檢查護士討論以下藥物:

- ✓ 血液稀釋劑
- / 糖尿病藥物
- 止痛藥(處方藥和非處方藥)
- ✓ 治療成癮的藥物,如 methadone 或 Suboxone (Buprenorphine)

重要事項!

✓ 如果您的手術被延遲或推遲, 而且我們要求您更換常規藥物 (如血液稀釋劑)以準備進行 手術,請聯繫外科醫生辦公室 以尋求建議。如果您在醫院, 也可以與護理團隊討論。

- o 血液稀釋劑:有時在手術前需要停用血液稀釋劑。血液稀釋劑包括 Coumadin、Plavix、Xarelto 和 aspirin 等。(此列表並沒有列出所有血液稀釋劑。)如果您使用血液稀釋劑,請確保您已與外科醫生或術前檢查護士討論過任何所需的變更。**請不要自行變更任何藥物**。尋求建議。如果建議您停用包括 aspirin 等血液稀釋劑,則開具處方的醫生必須同意這一變更。與外科醫生或術前檢查護士討論這一重要步驟。
- 如果您出現感冒或流感症狀、喉嚨痛、發燒、咳痰、眼部分泌物或手術部位附近

出現皮疹, 請聯繫外科醫生辦公室。 如果您在手術當 天出現上述任何症狀, 可能會取消手術。

■ 規劃術後護理。如果安排您在手術當天回家,您必須 安排一名有能力的成年人送您回家。除非由有能力的 成年人(非駕駛員)陪同,否則您不得乘坐計程車、 共乘車或租車回家。如果沒有有能力的成年人安全地 送您回家,您的手術將被取消。

手術前一天晚上

- 按照給您提供的說明,使用 CHG 肥皂(Chlorhexidine Gluconate)淋浴。
- 午夜後不要吃任何東西。
- 除非另有通知,否則您可以在午夜後飲用適量的清澈 液體(請參閱方框),但在您到達醫院之前兩小時內 應停止飲用。這是計畫開始手術前一個半小時左右。

手術當天

- 按照給您提供的說明,使用 CHG 肥皂再次淋浴。
- **遵循**術前檢查護士給您提供的**用藥說明**。
- 不要進食。必須在您計畫到達醫院時間之前兩小時內 停止飲用清澈液體。硬糖應被視為清澈液體,必須在 到達醫院時間之前兩小時內停止吃糖。
- 您可以刷牙。

手術前飲用液體

除非另行通知,否則您可以飲用 清澈液體,但在**到達醫院前兩小時內**請停止飲用。如果您選擇飲 用液體,一小時內的飲用量不得 超過 12 盘司(除非外科醫生或 術前檢查護士**另有指示**)。手術 前應避免胃部脹滿或脹氣。

清澈液體包括:

- 水(非汽水)
- 蘋果汁、蔓越橘汁或白葡萄 汁
- 清咖啡或清茶(**不加**牛奶、 鮮奶油、奶粉或糖)
- Kool-Aid \ Gatorade \ Propel
- 冰棒/冰棍(**不包括**冷凍水果 棒和冰淇淋條)
- 果凍
- 不含脂肪的清湯

翻頁→

- 請到院區和外科登記處報到。外科醫生辦公室會告訴您具體地點(見本文件第 4 頁)。**請確保在您的計畫「到達時間」之前辦理登記手續。**
- 請**不要將貴重物品帶到醫院**。不要戴任何首飾。不要使用**乳液**,也不要**化妝**或戴 隱形眼鏡。不要吸煙。
- 到達後,您將被帶到術前隔離區進行術前準備。如果您在手術當天回家,除非另有 指示,否則您的陪護人員應可在手術結束後兩小時內將您送回家。
- 您的手術時間可能會因不可預見的情況(如緊急情況)而延遲。如果手術延遲,我們將盡一切努力通知您。

手術後

- 將把您送到恢復區(麻醉後監護室,PACU),直到您可以回到病房或可以出院為止。
- 如果您在手術當天回家,我們建議有人陪伴您至少24小時。
- 如同其他任何手術,術後可能出現一些疼痛。我們將與您一起決定如何緩解疼痛。 這通常並不意味著完全止痛。我們會將疼痛程度降到您可以忍受的範圍之內,並確 保您能夠盡量保持活躍並獲得足夠的休息。我們會給您提供一份出院計畫,其中包 括如何在您回家後管理不適。

報到和停車地點:尋找手術院區和大樓

如果您在BIDMC 車庫裡停車超過兩個小時,可以享受停車折 扣。請要求手術大樓服務台的工作人員在您的停車憑證上蓋章。 前往醫療中心的路線圖:

■ 電話:617-667-3000 或瀏覽 www.bidmc.org

□ 東院區:Feldberg 大樓

- Feldberg 手術室位於 Brookline 大街 330 號的 Feldberg 大樓 3 樓。
- 如果您在手術後入院,並在東院區 Feldberg 內接受手術,請將車開至 Feldberg 主入口,並遵循有關停車的標誌。進入 Feldberg 大廳,並在總台辦理手術登記手續。您的病房很可能在東院區的一個護理區內。手術完成後,我們才能知道確切的病房號碼。
- 如果您在手術後回家,並在東院區 Feldberg 內接受手術,請將車停在 Shapiro 臨床中心車庫中,因爲您將從該地點出院。Shapiro 臨床中心位於 Brookline 和 Longwood 大街交界處。車庫入口位於大樓後部的 Binney 街 98 號(Longwood 大街旁)。乘車庫電梯到 Shapiro 臨床中心大廳,再乘 Shapiro 臨床中心電梯到 2 樓。沿封閉式天橋/人行道的藍色走廊進入 Feldberg 大樓。(如果您需要輪椅,請在 Shapiro 臨床中心大廳總台尋求幫助。)到達 Feldberg 大樓後,您會看到三台藍色電梯。乘坐其中一個電梯,到一層 Feldberg 大廳,然後在服務台辦理登記手續。

□ 東院區:Shapiro 臨床中心

- **Shapiro 手術室**位於 Longwood 和 Brookline 大街交界處的 Shapiro 臨床中心 3 樓。車 庫入口位於大樓後部的 Binney 街 98 號(Longwood 大街旁)。
- 乘車庫電梯到 Shapiro 臨床中心大廳,再乘 Shapiro 臨床中心電梯到 3 樓。**遵循標誌, 到達外科登記處。**

□ 西院區:Rosenberg 大樓

- **西院區手術室**位於 Deaconess 路 1 號(Brookline 大街旁)的 Rosenberg 大樓 5 樓。 進入位於 Deaconess 路 1 號的 Rosenberg 大廳。**在大廳服務台辦理登記手續。**
- Rosenberg 大樓入口每週7天,每天24小時提供代客停車服務。位於Crossover 大 街的Pilgrim 路車庫提供自助停車,可以透過Pilgrim 路或Autumn 大街到達車庫。

本材料由貝絲以色列女執事醫療中心(BIDMC)從事手術、麻醉和護理工作的臨床醫生撰寫。由貝絲以色列女執事學習中心製作和分 發。 2020 年 Beth Israel Deaconess Medical Center 版權所有。保留一切權利。LC0725